

<b>Escala clínica de avaliação da sialorreia em Doença de Parkinson – (SCS-PD-PE)</b>			
Por favor, leia as seguintes perguntas e tente responder tendo como base o modo <u>como se sentiu na última semana</u> .			
A. Durante o dia, em que momento sente que há mais saliva na sua boca?			
0 - Nunca	1 – Durante as refeições	2 - Durante o dia, sem relação com as refeições	3 - Sempre, mesmo quando estou a dormir.
B. Quando está a dormir, que quantidade de saliva existe na sua boca?			
0 - Não noto um aumento na saliva.	1 - Noto um aumento da saliva na minha boca, mas a minha almofada não fica molhada.	2 - A minha almofada fica molhada.	3 - A minha almofada e outras roupas da cama ficam molhadas.
C. Quando está acordado...			
0 - Não me babo	1 - A saliva molha os meus lábios.	2 - A saliva acumula-se nos meus lábios mas não me babo.	3 - Babo-me.
D. A acumulação de saliva na sua boca prejudica a sua fala?			
0 - Não.	1 - Tenho que engolir frequentemente para evitar dificuldades.	2 - Tenho dificuldades em falar devido à saliva.	3 - Não consigo falar.
E. A acumulação de saliva na sua boca prejudica a sua capacidade de comer?			
0 - Não.	1 - Tenho que engolir a saliva frequentemente para evitar dificuldades.	2 - Tenho dificuldade em comer devido à saliva.	3 - Não consigo comer devido à saliva.
F. Quantas vezes se baba durante o dia?			
0 - Nunca.	1 - Não mais do que três vezes.	2 - Muitas vezes. Tenho que levar um lenço comigo sempre.	3 - Permanentemente.
G. A acumulação de saliva incomoda-o quando sai ou vai a encontros sociais?			
0 - Não.	1- Noto uma acumulação de saliva, mas não me incomoda.	2 - Apercebo-me de que as outras pessoas reparam, mas consigo controlar a situação (por exemplo, com um lenço).	3 - Deixei de ir a encontros sociais.